

ПЕРЕНОСИМОСТЬ ТЕРИПАРАТИДА У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ

© Мазуров В.И., Жугрова Е.С., Смакотина А.И.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»

кафедра терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э.Эйхвальда

В течение последних 10 лет расширились возможности консервативного лечения остеопороза с учетом появления новых препаратов, оказывающих влияние на разные звенья патогенеза заболевания. Вместе с тем, до конца не решены проблемы, связанные с назначением своевременного комплексного лечения и оценки безопасности терапии.

Целью настоящего исследования являлось изучение переносимости терапии Терипаратидом в течение года.

Материалы и методы: В исследование было включено 30 женщин средний возраст которых составил $(60 \pm 6,0)$ лет с длительностью заболевания $10,0 \pm 5,0$ лет. У всех пациентов был – тяжелый постменопаузальный остеопороз, осложненный множественными переломами вертебральными и невертебральными. Риск согласно FRAX составил более 30%.

Результаты. В популяцию для анализа безопасности вошли данные всех 30 (100%) пациенток, включенных в исследование. Во время лечения исследуемым препаратом были зарегистрированы следующие нежелательные явления (НЯ): у 6 пациенток отмечалось головокружение, которое уменьшалось при введении препарата в вечерние время. У 3-х – тошнота, которая уменьшилась ко 2-му месяцу терапии. У 1 – местная реакция в виде ограниченной эритемы, которая проходила через 1 час после инъекции. Все нежелательные явления не требовали отмены препарата.

В результате проведенного анализа клинически значимых нежелательных явлений мы не наблюдали. Препарат обладает хорошей переносимостью. Таким образом, исследования показывают, что лечение терипаратидом у пациентов с тяжелым остеопорозом ассоциировано с хорошей приверженностью к лечению, высокой эффективностью в отношении снижения риска как позвоночных, так и внепозвоночных переломов, что может быть следствием улучшения качества кортикальной костной ткани.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Остеопороз; лечение; терипаратид.

TERIPARATIDE TOLERABILITY IN PATIENTS WITH SEVERE OSTEOPOROSIS

© Mazurov V.I., Zhugrova E.S., Smakotina A.I.

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov

KEYWORDS: Osteoporosis; treatment; teriparatide.